



SUPRAZAN^{NP}K

AZOT Z POWIETRZA biopreparat

w uprawach wszystkich roślin
i na wszystkich rodzajach gleb

naturalnie, kompleksowe ODŻYWIANIE ROŚLIN

SUPRAZAN^{NP}K to unikatowy, kompleksowy biopreparat skomponowany ze szczepów mikroorganizmów, które działając w środowisku dostarczają roślinom **azot (N)**, **fosfor (P)** i **potas (K)**, promując ich wzrost przy jednoczesnej regeneracji i rewitalizacji gleby.

SUPRAZAN^{NP}K zawiera Mikrobiom troficzny[®], którego zastrzeżony skład mikrobiologiczny bezkonkurencyjnie wpływa na wzrost i rozwój roślin.

Azotobacter chroococcum GBR AS $\geq 8-9 \times 10^9$
posiada status biopromotora w uprawach pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, prosa i wyki oraz roślin oleistych i okopowych

Azospirillum brasilense GBR AB $\geq 5-7 \times 10^8$
ma zdolność wpływania na wzrost roślin uprawnych poprzez produkowanie różnych hormonów i do efektywnego wiązania azotu

Herbaspirillum seropedicae GBR HS $\geq 4-5 \times 10^8$
wiąże azot atmosferyczny poprzez wewnętrzną symbiozę z roślinami uprawnymi, u roślin strączkowych intensyfikuje nodulację, a w zbożach dostępność fosforu

Bacillus megaterium GBR BM $\geq 3-6 \times 10^8$
bakterie pobudzające wzrost roślin oraz odporność na choroby, zwiększają przyswajalność fosforu i częściowo potasu

Frateuria aurantia GBR FA $\geq 2-3 \times 10^8$
wpływa na zwiększenie biomasy oraz zawartość chlorofilu, powoduje wzrost przyswajalnej formy potasu (K) w glebie

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat może być stosowany w uprawach polowych wszystkich roślin i na wszystkich glebach. Stosować go można również na użytkach zielonych, w uprawach sadowniczych, warzywnych oraz roślin ozdobnych i traw.

Preparat **SUPRAZAN^{NP}K** można stosować doglebowo w formie oprysku drobnokroplistego przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub opryskiwacza ręcznego. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Sporządzoną zawiesinę środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (200-800 l/ha).

Zabieg najlepiej wykonywać po zmierzchu lub wczesnym ranem, od momentu kielkowania do fazy dojrzewania.

DAWKOWANIE

Aplikacja dolistna: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1000 ml/ha.

UWAGI DO STOSOWANIA

Preparat zawiera żywe organizmy. Należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy aplikacją środka mikrobiologicznego a zastosowaniem środków chemicznych, pestycydów i nawozów mineralnych.

Po otwarciu preparat zużyć w ciągu 12 godzin. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej (odpowiednia odzież, rękawice oraz obuwie). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w warunkach chłodniczych (4-8°C), nie zamrażać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą.

Wybrzuszenie opakowania to efekt naturalnej działalności mikroorganizmów i nie stanowi wady.

Twój partner i doradca

OBROL Kulczyński Sp.j.
ul. Spółdzielcza 3a, 62-020 Kruszwonia
tel. 61 817 30 68, e-mail: biuro@obrol.pl
www.adiuwanty.pl www.obrol.pl

 **OBROL**[®]